

Ibupirac flex

Ibuprofeno 400mg.
Orfenadrina Citrato 35mg.



Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene Ibuprofeno 400 mg, Citrato de Orfenadrina 35 mg y excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Antiinflamatorio, analgésico, relajante muscular.

Acción Farmacológica:

Ibupirac Flex combina las acciones de dos principios activos: Ibuprofeno y Citrato de Orfenadrina. El Ibuprofeno es un analgésico no esteroideo que inhibe la síntesis de prostaglandinas, lo que brinda un rápido alivio del dolor característico de las contracturas musculoesqueléticas. La Orfenadrina es una amina terciaria antimuscarínica que actúa en forma altamente selectiva sobre los receptores muscarínicos centrales eliminando la contractura muscular.

Farmacocinética:

El Ibuprofeno por vía oral es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal. La concentración máxima es alcanzada después de 1 ó 2 horas después de la toma. Entre el 90 y 99% se encuentra unido a proteínas plasmáticas. Se excreta rápidamente por la orina principalmente como metabolitos y sus conjugados. Se distribuye en muy pequeñas cantidades o nada en la leche materna. El Citrato de Orfenadrina también es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal. Se excreta principalmente en la orina como metabolitos y una pequeña cantidad como droga incambiada. La vida media es de 15.5 horas para dosis única y entre 30.5 a 40 horas para dosis repetidas.

Indicaciones:

La asociación de Ibuprofeno y Citrato de Orfenadrina está indicada para el alivio del dolor asociado a la contractura musculoesquelética.

Posología y Modo de Administración:

Dosis sugerida: 1 ó 2 comprimidos cada 6-8 horas. En casos de dolores intensos, se aconseja iniciar el tratamiento con 2 comprimidos en una sola toma.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguna de las drogas. Está contraindicado en presencia de hipertrofia prostática o uretral, megaesófago, obstrucción pilórica o duodenal, glaucoma, miastenia gravis, úlcera gastroduodenal severa o en actividad, angioedema o reactividad broncospástica al ácido acetilsalicílico u otros AINEs, hipotonía muscular. No está indicado su uso durante el embarazo y la lactancia.

Efectos secundarios:

Pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor epigástrico y tinnitus. Se han reportado casos de agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia y meningitis aséptica relacionados al Ibuprofeno.

Puede causar mareos, ansiedad, confusión, insomnio. Pueden observarse efectos adversos antimuscarínicos como sequedad de boca, dilatación de pupilas, sequedad de la piel, bradicardia seguida de taquicardia, disminución de la motilidad gastrointestinal que puede llevar a constipación, retención de orina, visión borrosa, aumento de la presión intraocular. Reacciones de hipersensibilidad desde urticaria hasta shock anafiláctico.

Precauciones y Advertencias:

Administrar con precaución a pacientes con asma bronquial o broncoespasmo. Los AINEs deben ser administrados con precaución a pacientes con antecedentes de úlcera o hemorragia gastrointestinal. Se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca, corona riopatía, arritmias cardíacas y durante el uso simultáneo con antihipertensivos. Se deben evitar los tratamientos prolongados.

Interacciones Medicamentosas:

Los efectos de Orfenadrina pueden ser intensificados por la administración concomitante con otras drogas con acción antimuscarínica como Amantadina, algunos antihistamínicos, fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos. La reducción de la motilidad gástrica causada por los antimuscarínicos puede afectar la biodisponibilidad de otras drogas. Los parasimpaticomiméticos antagonizan la acción de los antimuscarínicos. La asociación de Ibuprofeno con otros anticoagulantes orales y Heparina pueden aumentar el riesgo de hemorragia. El Ibuprofeno puede elevar los niveles plasmáticos de Litio así como una reducción en su depuración renal. El uso simultáneo de otros AINEs puede aumentar los potenciales efectos adversos de esa clase de fármacos.

Presentación: Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos recubiertos.

Conservar a temperatura ambiente, entre (15-30) C.

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel. (02)1722

Mantener fuera del alcance de los niños.



IBUPIRAC FLEX 600 VER



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy